

ФИНГОЛИМОД

**Специальная памятка
о беременности для пациенток**



BIOCAD
Biotechnology Company

**Перед началом лечения
препаратом Финголимод**

**Препарат Финголимод
противопоказан беременным
женщинам** и женщинам,
способным к деторождению
(в том числе подросткам),
не использующим эффективные
средства контрацепции.

В начале лечения и регулярно в последующем лечащий врач будет информировать Вас о риске тератогенного эффекта препарата (вызывает внутриутробные дефекты у плода) и о необходимых действиях для минимизации этого риска.

Перед началом лечения необходимо выполнить тест на беременность, отрицательный результат теста должен быть подтвержден врачом.

Лечащий врач проинформирует Вас о необходимости эффективной контрацепции во время лечения и в течение 2 месяцев после его прекращения. Проконсультируйтесь с лечащим врачом о наиболее эффективных доступных вам вариантах контрацепции.

Пожалуйста, прочтите Памятку о препарате Финголимод для пациентов, предоставленную Вам лечащим врачом.

**Во время применения
препарата Финголимод**

**Женщинам следует
избегать беременности
во время лечения.**

Во время применения препарата Финголимод пациенты должны использовать эффективные средства контрацепции.

Женщинам следует избегать беременности во время лечения и в течение 2 месяцев после прекращения лечения.

Тесты на беременность необходимо повторять с надлежащей периодичностью.

Лечащий врач будет регулярно напоминать Вам о серьезных рисках препарата Финголимод для плода.

Если Вы забеременели или планируете беременность, пожалуйста, обсудите это с лечащим врачом, потому что лечение препаратом Финголимод в этом случае должно быть прекращено.

В случае наступления беременности лечащий врач проведет с Вами консультацию.

Лечащий врач расскажет Вам о вредном воздействии препарата Финголимод на плод и оценку потенциального исхода.

**После прекращения лечения
препаратом Финголимод**

**Немедленно сообщите
лечащему врачу,** если Вы
считаете, что рассеянный
склероз усугубляется.

Немедленно сообщите лечащему врачу, если Вы считаете, что рассеянный склероз (РС) усугубляется (например, появилась слабость или изменения зрения), или если Вы отметили какие-либо новые симптомы после прекращения лечения препаратом Финголимод в связи с беременностью.

Эффективная контрацепция требуется в течение 2 месяцев после прекращения лечения препаратом Финголимод из-за того, что препарату требуется время, чтобы вывестись из организма.

Сообщение о побочных эффектах (нежелательных реакциях)

Если у Вас возникают побочные эффекты (нежелательные реакции) при применении каких-либо лекарственных препаратов, **проконсультируйтесь с лечащим врачом**, работником аптеки или медицинской сестрой.

К ним относятся любые возможные нежелательные реакции, в том числе не указанные в Инструкции по медицинскому применению.

Вы также можете сообщить о возникновении побочных эффектов (нежелательных реакций), возникающих при приеме лекарственного препарата Финголимод (АО «БИОКАД»). Сделать это можно любым удобным способом:

-  по электронной почте: **safety@biocad.ru**;
-  по почте: 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи., 34-А;
-  по факсу с пометкой «фармаконадзор»: **8 (812) 380-49-33 доб. 8639**;
-  по телефону: **8 (812) 380-49-33**;
-  через онлайн форму на сайте **biocad.ru/farmakonadzor**.

Сообщая о побочных эффектах (нежелательных реакциях), Вы помогаете получить больше сведений о безопасности Вашего препарата.

Обо всех случаях беременности следует сообщать в АО «БИОКАД», используя любой удобный способ:

✉ по электронной почте: **safety@biocad.ru;**

✉ по почте: 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи., 34-А;

📠 по факсу с пометкой «фармаконадзор»:
8 (812) 380-49-33 доб. 8639;

☎ по телефону: **8 (812) 380-49-33;**

🌐 через онлайн форму на сайте
biocad.ru/farmakonadzor.

