

Цикл брошюр
«Библиотека
рассеянного
склероза»
БЕТАЛАЙФ

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

по терапии рассеянного
склероза лекарственным
препаратом терифлуноид



БЕТАЛАЙФ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пациент, Вам был назначен препарат, изменяющий течение рассеянного склероза – Терифлуномид.

В данной брошюре Вы найдете краткую информацию по препарату, показаниям и возможным нежелательным реакциям. Полную информацию Вы можете получить в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

Внимательно ознакомьтесь с данным материалом. Если Вы испытываете одну из нежелательных реакций, указанных в данной брошюре, обратитесь к своему лечащему врачу.

Для получения дополнительной информации и для сообщения о развитии нежелательной реакции Вы можете по телефону и адресу электронной почты, указанных на упаковке или в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

БЕТАЛАЙФ — СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ



Интернет-портал BETALIFE.RU

Вебинары от ведущих специалистов, научные статьи и последние новости из области рассеянного склероза.



Наведите включенную камеру мобильного телефона на QR-код для перехода на сайт betalife.ru



Информационные материалы

Цикл брошюр «Библиотека рассеянного склероза».



Наведите включенную камеру мобильного телефона на QR-код, чтобы ознакомиться с брошюрами на сайте betalife.ru/services/library



Круглосуточная горячая линия 8 (800) 200 08 16

Специалисты горячей линии ответят на вопросы, касающиеся терапии рассеянного склероза препаратами BIOCAD.

При необходимости Вы можете получить консультацию менеджера по медицинской информации.



Мобильное приложение BETALIFE

Электронный дневник самочувствия для людей с рассеянным склерозом.



Наведите включенную камеру мобильного телефона на QR-код, чтобы скачать приложение BETALIFE

Обращение в сервисную программу специализированной поддержки пациентов с рассеянным склерозом БЕТАЛАЙФ не может заменить очную консультацию лечащего врача.

ТЕРИФЛУНОМИД

Информация о препарате



Международное непатентованное или группировочное наименование:

терифлуноמיד



Лекарственная форма:

таблетки, покрытые пленочной оболочкой



Состав:

1 таблетка содержит –
терифлуноמיד 14,00 мг.



Показания к применению

Рецидивирующе-ремиттирующий рассеянный склероз.



Противопоказания

- Гиперчувствительность к действующему веществу или какому-либо из вспомогательных веществ препарата.
- Тяжелая почечная недостаточность
- Беременность
- Период грудного вскармливания
- Тяжелый иммунодефицит, например СПИД
- Тяжелые нарушения костномозгового кроветворения или анемия, значимое снижение лейкоцитов, нейтрофилов или тромбоцитов
- Тяжелая печеночная недостаточность
- Тяжелые активные инфекции до момента выздоровления
- Возраст до 18 лет
- Тяжелая гипопроотеинемия
- Дефицит лактазы, непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Лекарственный препарат Терифлуноמיד не должен приниматься во время беременности или женщинами с сохраненным репродуктивным потенциалом, если они не используют эффективные методы контрацепции. Так как препарат Терифлуноמיד может вызвать серьезные дефекты в развитии у плода.

- Не начинайте приём препарата Терифлуноמיד, если Вы беременны или предполагаете беременность. Ваш доктор должен попросить Вас сдать тест на беременность до назначения препарата.
- Используйте эффективную контрацепцию во время приёма препарата Терифлуноמיד. Если Вы решите забеременеть или решите сменить метод контрацепции после приёма препарата Терифлуноמיד, сообщите об этом своему лечащему врачу.
- Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы планируете кормить грудью.
- Если Вы предполагаете беременность во время приёма препарата Терифлуноמיד или в период двух лет после прекращения лечения, Вы должны незамедлительно сообщить своему лечащему врачу и сдать тест на беременность. Если беременность подтвердится, то Вам могут быть назначены лекарственные препараты для ускоренного выведения терифлуномида из организма. Это может снизить риск для плода.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата группы препаратов Терифлуноמיד (Абаджио®, Терифлуноמיד БИОКАД, Феморикс®, ТРЕИФЛУНОМИД-ХИМРАР), информация адаптирована.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Рекомендуемая доза препарата – 14 мг в день. Таблетки следует принимать целиком, запивая водой, независимо от приёма пищи.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Наиболее часто могут возникать следующие нежелательные реакции: головная боль, диарея, тошнота и выпадение волос. Данные реакции проявляются в виде легкой и умеренной степени тяжести, преходящие и редко приводят к прекращению приёма лекарства.

Полный перечень нежелательных реакций указан в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. **При развитии серьезных нежелательных реакций следует немедленно прекратить терапию и обратиться к лечащему врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.**

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата группы препаратов Терифлуноמיד (Абаджио®, Терифлуноמיד БИОКАД, Феморикс®, ТРЕИФЛУНОМИД-ХИМРАР), информация адаптирована.

BETALIFE.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

BIOCAD

Программа BETALIFE создана при поддержке компании BIOCAD



198515, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. поселок Стрельна, п. Стрельна, ул. Связи, д. 38,
стр.1, помещ. 89



+7 (812) 380-49-33/ Факс: +7 (812) 380-49-33

RU.TIM.00253.14.02.2021

Информация программы не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения, и не может быть заменой очной консультации врача

Не для продажи. Распространяется для некоммерческого использования в качестве вспомогательной информационной литературы по различным медикаментозным аспектам заболевания. Не является рекламой